

## Инструкция по применению SAM-e 400/CAM-e 400

**Состав на 1 таблетку:** активный ингредиент: S-аденозил – L-метионин – 400 мг; другие составляющие: целлюлоза микрокристаллическая, маннит, жирные кислоты, магния оксид, гидроксипропилцеллюлоза, кремния диоксид, поливинилпирролидон, титана диоксид, тальк, магния сульфат, этилцеллюлоза, натрия карбоксиметилцеллюлоза, глицерин, краситель: бриллиантовый синий FCF (E133), карнаубский воск.

Без ГМО.

Пищевая (питательная) и энергетическая ценность (калорийность) продукта на 1 таблетку: белки – 0,27 г, жиры – 0,15 г, углеводы – 0,1 г, калорийность – 3,9 ккал/16,27 кДж

**Рекомендации по применению:** применяется как диетическая добавка для взрослых с 18 лет, как дополнительный источник S-аденозил – L-метионина с целью улучшения функционального состояния костно-суставного аппарата и гепато-билиарной системы. Благодаря увеличению включения в синтез хряща сульфатных групп, образовавшихся вследствие его транссульфирования S-аденозил – L-метионин способствует восстановлению хрящевой ткани, участвует в образовании мощного антиоксиданта глутатиона, что обеспечивает уменьшение окислительного стресса в хряще и замедляет его разрушение; обладает липотропными и противовоспалительными свойствами. Благодаря нормализации уровня метионина и увеличению концентрации глутатиона способствует поддержанию функций печени, оказывает гепатопротекторное действие при токсических воздействиях алкогольного и неалкогольного генеза.

Если врач не назначил иначе, соблюдайте следующие рекомендации.

**Способ применения и рекомендуемая суточная доза:** принимать по 1 таблетке 1-2 раза в сутки. Курс и срок употребления определяет врач индивидуально. Доза может быть увеличена лечащим врачом. Не превышать рекомендуемую суточную дозу.

Беременность и кормление грудью: не применять женщинам во время беременности и в период кормления грудью.

**Предосторожность при применении:** индивидуальная повышенная чувствительность к отдельным компонентам продукта. При возникновении любых аллергических реакций, включая крапивницу, затрудненное дыхание, отек горла, отек губ, языка или лица, а также другие нежелательные проявления, такие как боль в желудке, тошнота, диарея, метеоризм, тревога, судороги и бессонница. немедленно обратиться к врачу.

Перед началом применения диетической добавки и одновременном применении с любыми лекарственными средствами рекомендована консультация врача.

Не следует использовать в качестве замены полноценного рациона питания.

Не использовать при маниакально-депрессивных состояниях.

Следует с осторожностью применять больным, страдающим диабетом или гипогликемией, и тем, кто принимает лекарства, травы или добавки, которые влияют на уровень сахара. Существует риск развития серотонинового синдрома, поэтому не следует одновременно с диетической добавкой

принимать следующие лекарственные средства: декстрометорфан, меперидин (демерол), трамадол (ультрам), антидепрессанты, леводопа (L-допа), применяемые при диабете лекарственные средства.

Не является лекарственным средством.

Форма выпуска: таблетки

Масса нетто 1 таблетка: 1190 мг ± 7%

Дата производства: указано на упаковке

Срок годности: 2 года.

Номер партии: указано на упаковке.

Условия хранения хранить в оригинальной упаковке при температуре до 30 °С в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте.

Производитель: Ferrery Farmaceutici S.r.l./Феррери Фармацеутиси С.Р.Л. Корсо Сан Лорензо1-37026 Пескатино (ВР), Италия для Delta Medical Promotions AG, Отенбахгассе 26, Цюрих CH-8001, Швейцария, [www.schonen-swiss.com](http://www.schonen-swiss.com).

Представитель в Украине: Представительство «Дельта Медикел Промоушнз АГ», 08132, г. Вишневое, ул. Черновола, 43, тел.: (044) 585-00-41.

Штрих-код: указано на упаковке.